**RIUNIONE
ANNUALE SIN
APPULO-LUCANA**

3-4 Novembre 2022

Nicolaus Hotel Bari

CON IL PATROCINIO DI

Sin
SOCIETÀ ITALIANA DI NEUROLOGIA

RESPONSABILI SCIENTIFICI

Prof.ssa Maria Trojano
Prof. Damiano Paolicelli

*Biomarker di malattia con tecniche di
Neurimaging strutturale e funzionale non
invasiva*

Dott.ssa Alessia Manni

Dipartimento di

Biomedicina Traslazionale Neuroscienze "DiBrain"

Università degli Studi di Bari «Aldo Moro»

**NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE IMAGING
OF THE BRAIN IN MULTIPLE SCLEROSIS**

I. R. YOUNG

A. S. HALL

Central Research Laboratories, Thorn-EMI Ltd, Hayes, Middlesex

C. A. PALLIS

N. J. LEGG

G. M. BYDDER

R. E. STEINER

*Departments of Medicine (Neurology) and Radiology,
Royal Postgraduate Medical School, Hammersmith Hospital,
London W12 0HS*

Summary Ten patients with multiple sclerosis (MS) were scanned by means of cranial X-ray computed tomography (CT) with and without intravenous contrast enhancement, and by nuclear magnetic resonance (NMR) using an inversion-recovery sequence. Altogether 19 lesions varying in size between about 7 mm × 5 mm and 13

We now present the results of NMR examination of ten patients MS and compare them with those obtained with CT.

Patients and Methods

Patients

Ten patients investigated in the Department of Medicine (Neurology) at Hammersmith Hospital were chosen for evaluation. Eight (patients 1 to 8) fulfilled the criteria for a diagnosis of "clinically definite" MS suggested by McDonald and Halliday.⁵ Patient 9 fell into their "progressive probable" category and patient 10 into their "early probable" group.

Age at onset of the disease ranged from 18 to 50 years, and the duration of the disease at the time of scanning varied from 7 months

Fig. 1—Comparable CT (A) and NMR (B) scans in patient 10 at mid-ventricular level.

The two posterior periventricular lesions seen on the CT scan are also seen on the NMR scan (large arrows). In addition 6 smaller lesions are seen on the NMR scan at the lateral margin of the lateral ventricles (small arrows). The sharply defined area on the medial margin of the left posterior horn is a circular artefact.

"If you can't measure it,
you can't improve it."

Peter Drucker

	Multiple sclerosis diagnosis	Assessment of disease activity and monitoring effectiveness of the disease-modifying treatment*
Brain MRI protocol		
Axial T2-weighted (TSE or FSE) sequences†	Recommended	Recommended (optional if high-quality sagittal 3D T2-weighted FLAIR and multiplanar reconstruction in axial and sagittal planes are available)
Sagittal T2-weighted FLAIR (preferably 3D; fat suppression is optional)	Recommended	Recommended
Axial T2-weighted FLAIR (unnecessary if a sagittal 3D FLAIR with multiplanar reconstruction is obtained; fat suppression is optional)	Recommended	Recommended
Axial (or 3D sagittal) T1-weighted sequences after contrast‡	Recommended	Optional
Diffusion-weighted imaging	Optional	Optional (should be considered for differential diagnosis)
Double inversion recovery or PSIR for detecting cortical or juxtacortical lesions	Optional	Optional
High-resolution T1-weighted sequences (isotropic 3D acquisition; for quantitative assessment of brain volume)	Optional	Optional
Susceptibility-weighted imaging	Optional for assessing the central vein sign	Not required
Spinal cord MRI protocol		
At least two of: sagittal T2-weighted sequences (TSE or FSE), proton density-weighted sequences (TSE or FSE), or STIR	Recommended	Optional
Sagittal 3D heavily T1-weighted sequences (PSIR or magnetisation-prepared rapid acquisition of gradient echoes§) only for the cervical segment	Optional	Optional
Axial T2-weighted (TSE or FSE) or gradient-recalled echo to corroborate, characterise, and confirm lesions detected on sagittal images or to detect lesions in spinal cord segments with high clinical suspicions of involvement	Optional	Optional
Sagittal T1-weighted sequences (TSE or FSE) before contrast	Optional	Optional
Sagittal T1-weighted sequences (TSE or FSE) after contrast‡	Recommended	Optional
Axial T1-weighted sequences (TSE or FSE) after contrast‡	Optional	Optional
Optic nerve MRI protocol		
Axial and coronal fat-suppressed T2-weighted sequences or STIR of optic nerve	Optional (can be considered in some clinical situations; 2D or 3D acquisition)	Not required
Axial and coronal fat-suppressed T1-weighted sequences post contrast of optic nerve	Optional (can be considered in some clinical situations; 2D or 3D acquisition)	Not required

Wattjes MP, Lancet Neurol. 2021

McDonald 2001 ¹⁰	
Dissemination in space (on either baseline or follow-up MRI)	Three or more of the following: 9 T2 lesions or 1 Gd-enhancing lesion 3 or more PV lesions 1 or more JC lesions 1 or more PF lesions A cord lesion can replace a brain lesion.
Dissemination in time	A Gd-enhancing lesion at least 3 months after CIS onset A new T2 lesion relative to a prior scan, at least 3 months after CIS onset

Includere la RMN nei criteri diagnostici

Definizione di precisi protocolli RMN

RMN come Biomarker: definizione e ruolo

«*Caratteristica*» che può essere misurata in maniera obiettiva e può essere considerata come indicatore di:

un normale processo biologico

un processo patologico

una risposta farmacologica ad una terapia

Biomarkers Definitions Working Group. Clin Pharmacol Ther. 2001

La RMN come biomarker ideale:

- correla bene con l'accumulo di disabilità nella storia naturale della malattia
- cattura tutti gli effetti (positivi e negativi) del trattamento
- Ha elevata sensibilità

➤ Definito quindi **“surrogato” di un end-point clinico:**

può sostituirlo e fornire informazioni circa diagnosi, prognosi o efficacia terapeutica, **in un tempo più breve** rispetto a quello necessario all' end-point

RMN come Biomarker

DIAGNOSTICO

ATTIVITA' DI
MALATTIA

RISPOSTA AL TRATTAMENTO

Nuovi Biomarker di RMN: overview

Leptomeningeal Infiltrates:

- Visible at ultra-high and high field MRI on post-contrast 3D T2-FLAIR¹⁷⁻¹⁹
- Used as biomarker for MS inflammation⁸⁹
- Differences in MS phenotypes⁵⁶
- Role in Cortical lesions' development¹⁸

Normal Appearing White Matter:

- New techniques to detect subtle pathological changes^{40-42,47,48}
- MTR used to monitor changes in myelin in clinical trials^{50,115,120,122-124}

White Matter Lesions:

- Distinctive lesion features (i.e. CVS and peripheral rim)^{24,27,72,74,80,88}
- Methods to detect SEL on conventional MRI⁸⁸

Cortical Lesions:

- Inclusion in 2017 McDonald criteria¹
- New MRI techniques to improve their detection⁶⁵⁻⁶⁷
- Association with clinical disability and cognitive impairment^{18,60}
- Association with meningeal inflammation^{18,60}
- Used to test the neuroprotective effect of DMD¹²¹
- Network based approaches applied to explore abnormalities within the principal brain networks⁹⁵⁻¹⁰⁶

Normal Appearing Grey Matter:

- Differences in regional GM atrophy development between phenotypes^{34,35}
- Role of DGM and thalamus volume loss in MS pathogenesis³⁵
- Relationship between cortical atrophy and motor and cognitive impairment³¹⁻³³

Figure 1. Advances in brain imaging in multiple sclerosis in different brain locations.

CVS, central vein sign; DGM, deep grey matter; DMD, disease-modifying drug; ihMT, inhomogeneous magnetization transfer; MRI, magnetic resonance imaging; MRS, magnetic resonance spectroscopy; MWF, myelin water fraction; NODDI, neurite orientation dispersion and density imaging; PET, positron emission tomography; qMT, quantitative magnetization transfer; SEL, slowly expanding lesion; TSC, total sodium concentration.

RMN strutturale: ruolo delle Lesioni Corticali

- **Gli attuali criteri diagnostici (Thompson *et al.* 2018) e le linee guida (Filippi *et al.* 2016) includono lesioni intracorticali, leucocorticali e iuxtacorticali**
- ✓ La diagnosi di SM può essere difficile nella pratica clinica per SM-Mimicks
- ✗ Le sequenze MRI avanzate raccomandate per la loro identificazione non sono ampiamente applicate in ambito clinico e possono essere di difficile interpretazione (Filippi *et al.* , 2019)

☐ 1051 soggetti da 14 centri

- ☐ 60% delle SM e 50% delle CIS con LC
- ☐ Nessuna differenza significativa nelle LC fra SM/CIS, ma le SM hanno ↑ LC di ogni altra patologia

- ☐ Lobi temporali
- ☐ Regioni superiori degli emisferi, specie nei lobi frontali

RMN strutturale: ruolo delle Lesioni Corticali

Ruolo nel predire la conversione clinica: da RMS a PMS

53 pazienti senza CLs= nessuno nella fase SP

- Valutato il numero delle Lesioni Corticali (CLs) e della sostanza bianca (WM), e il tasso di assottigliamento corticale, in 219 RRMS con 1 (n=116), 2 (n=53) e ≥3 (n = 50) ricadute nei primi 2 anni
- Follow-up= 7.9 anni
- **Danno corticale più severo all'esordio → più alto rischio di conversione ad SP**

RMN strutturale: CVS (+LC)

- Il **Central Vein Sign, CVS** differenzia la SM da altre malattie con caratteristiche radiologiche analoghe

Sistema automatico, **CVSnet**, che si basa su **pre-selezione manuale** (time-consuming) delle lesioni CVS- e CVS+, ed esclude alcune lesioni (**CVSe: lesioni confluenti, eccentriche rispetto alla vena, legate a più vene**)

Prototipo **CVSNet modificato** in grado di analizzare la presenza di CVS per tutti i tipi di lesioni cerebrali, con **valutazione completamente automatizzata**.

- ✓ **Accelerare la valutazione del CVS come biomarcatore diagnostico importante**
- ✓ **Aumentarne sensibilità, specificità ed accuratezza per lesioni CVS+, CVS- e CVSe**

Maggi P, et al, *NMR Biomed* (2020)

- ☐ 62% delle SM e 68% delle CIS con CVS

RMN strutturale: ruolo dell'atrofia della grigia

- ✗ Per anni la SM è stata ritenuta una patologia esclusivamente della SB
- ✓ Recenti studi hanno dimostrato come sia una patologia che interessa ab initio anche la sostanza grigia

- ☐ 665 RMN da 16 centri
- ☐ Nella SM prevalentemente coinvolta la SG profonda

- La perdita di volume della grigia (GM) contribuisce all'atrofia cerebrale
 - La progressione della disabilità è stata prevista meglio da alcuni dei modelli covarianti delle regioni GM, che da singole misure regionali o dell'intero cervello.

- ☐ Dati da RCT ASCEND (163 siti in 17 paesi)
- ☐ 1003 pazienti con SMSP

Biomarcatori: associazione con i diversi processi patologici

➤ **Biomarker = utilizzato per rilevare o confermare la presenza di una malattia o condizione di interesse o per identificare individui con un sottotipo della malattia.**

2016 FDA-NIH Biomarker Working Group

Nel corso degli ultimi anni → focus sulla neurodegenerazione e sulle forme progressive di malattia

Inflammation	Axonal degeneration	Microglial activation	Mitochondrial injury	Oxidation byproducts	Glutamate excitotoxicity

<ul style="list-style-type: none"> • Compartmentalized inflammation • T cells, B cells • Lymphoid follicles • Relatively intact blood-brain barrier 	<ul style="list-style-type: none"> • Demyelination • Loss of trophic support • Anterograde degeneration • Retrograde degeneration • Transsynaptic degeneration • Histotoxic hypoxia 	<ul style="list-style-type: none"> • Surrounding chronic active lesions • Clustering preactive lesions • Tracking along axons (repair versus degeneration) • Oxidation products 	<ul style="list-style-type: none"> • Nuclear/ mitochondrial DNA mutations • Clonal expansion and amplification • Decreased energy production and axonal degeneration • Amplification of oxidation 	<ul style="list-style-type: none"> • Accumulation of reactive oxygen species (ROS) • Poor clearance with defective mitochondria • Microglial oxidative burst 	<ul style="list-style-type: none"> • Direct demyelinating effects • Dysregulation of calcium homeostasis in axons and oligodendrocytes

... dalle lesioni anatomo-patologiche...

- 182 casi autoptici SM (Paesi Bassi)
- I pazienti progressivi hanno
 - carico lesionale ↑
 - ↑lesioni attive/inattive (croniche attive)
 - ↓ lesioni rimielinizzate rispetto a RR MS

Lucchetti S et al, Acta Neuropathologica (2018) 135:511–528

- 120 casi autoptici(USA/Austria)
- I pazienti progressivi hanno
 - ↑Smoldering , associate con attivazione della microglia e neurodegenerazione
 - ↑“Shadow” sono aree rimielinizzate ma più suscettibili ad eventuale secondo attacco infiammatorio

JM Frischer et al. Ann Neurol. 2015

... alla RMN strutturale (nuove metodiche): ruolo delle Slowly expanding lesions

- SEL possono essere identificate su RM 7T e 3T in vivo come lesioni croniche non-Gd+ con bordo paramagnetico

- 192 pazienti (f.u. 7 aa):
 - Persone con ≥ 4 SEL raggiungevano disabilità precocemente
 - Le lesioni «rimless» si riducevano volumetricamente nel corso del tempo, (-3,6%/anno), le SEL si espandevano (2,2%/anno; $P < 0,001$)

- ☐ Paz trial ORATORIO
- ☐ Terapie ad $\uparrow$ efficacia hanno maggiore azione sulle SEL

PET e Slowly expanding lesions (I)

Biological specificity

Positron Emission Tomography

Target: **TSPO**

Bodini , et al. 2021

36 People with MS and 19 Healthy controls
19 Controls: same age range same sex distribution

Characteristics	Patients
Number	36
Age (mean ± std)	48 ± 11
Disease duration (mean ± std)	9 ± 6
Sex(F/M)	21/15
MS Type	12RR-13SP-11PP
Genotype (MAB/HAB)	15/21

Relative [¹⁸F]-DPA714 binding to controls

Singh , et al. 2022

Lesion probability maps

Probability of a voxel to be in a lesion

Hamzoui et al, ECTRIMS 2022

PET e Slowly expanding lesions (II)

Maggiore prevalenza delle SEL nelle forme progressive

Correlazione delle SEL con peggioramento dell'EDSS

- 2-years change: EDSS stepwise change

RMN funzionale e fatica

➤ La fatica o *fatigue* è uno dei sintomi più comuni della SM: è riportata dal 75 -95% dei pazienti; è considerata dal 55-75% dei malati uno dei sintomi più invalidanti (Amato MP 2012)

- 42 SMRR
- SDMT /PASAT
- BDI II/ MFIS29
- ↑attivazione nella BA 40 sinistra, nella BA 40 destra (giro sopramarginale) e nella BA 6 sinistra (corteccia premotoria) nei pazienti con un punteggio più alto su MFIS

Metodiche di Neuroimaging Funzionale:

Vantaggi e Svantaggi

Le diverse metodiche di Neuroimaging Funzionale differiscono soprattutto per la loro capacità di **risoluzione spaziale** e **temporale** delle funzioni cerebrali.

Method	Type of signal	Resolution		Depth pervasion	Brain coverage	Invasive-ness	Mobility
		temporal	spatial
Functional near-infrared spectroscopy (fNIRS)	hemodynamic/metabolic	++	+	--	±	+++	+
Functional magnetic resonance imaging (fMRI)	hemodynamic/metabolic	-	++	+++	+++	+++	---

Ratings ranging from highly advantageous (+++) to extremely disadvantageous (---).

fNIRS: come funziona?

- La NIRS utilizza *la radiazione ottica*, precisamente la *banda spettrale nel vicino infrarosso (NIR, 700-950 nm)* per studiare i tessuti biologici
- La strumentazione permette di ottenere dati che riproducono il reale stato dell'ossigenazione del tessuto cerebrale, mediante il dosaggio "assoluto" dell'HbO₂ e Hb e quindi della StO₂.

Metodiche di Neuroimaging Funzionale a confronto

	fNIRS	fMRI	PET
Signal	HbO ₂ HbR	BOLD (HbR)	Cerebral blood flow Glucose metabolism
Spatial resolution	2–3 cm	0.3 mm voxels	4 mm
Penetration depth	<u>Brain cortex</u>	Whole head	Whole head
Temporal sampling rates	<u>Up to 10 Hz</u>	1–3 Hz	<u><0.1 Hz</u>
Range of possible tasks	<u>Enormous</u>	Limited	Limited
Robustness to motion	<u>Very good</u>	Limited	Limited
Range of possible participants	Everyone	<u>Limited, can be challenging for children/patients</u>	Limited
Sounds	Silent	<u>Very noisy</u>	Silent
Portability	<u>Yes, for portable systems</u>	None	None
Cost	Low	High	High

NIRS e fatica cognitiva: il nostro studio

Studio sulla Fatica Cognitiva nella Sclerosi Multipla: ricerca di Biomarcatori Neurofisiologici di malattia e valutazione dell'efficacia del Trattamento Riabilitativo Multimodale

Match per età, sesso, livello di istruzione

➤ PwMS (70% F , età 38.1 ± 6.1)

➤ SRT long-term retrieval :

0.87 ± 1.41 in HCs

vs

$p=0.03$

-0.42 ± 1.09 in pwMS

➤ SRT long-term storage :

0.97 ± 1.21 in HC

vs

$p=0.023$

-0.47 ± 0.6 in pwMS

➤ ↑ attivazione emodinamica PFC ($p < 0.05$) in SM nei primi 4 min del task

➤ **pwMS, hanno necessità di maggiore attivazione corticale per compiere lo stesso task**

Take home messages

- I clinici che si occupano di SM hanno necessità sempre crescenti di poter condividere ed analizzare dati che devono includere una **fenotipizzazione clinica, radiologica e biologica**, da una popolazione eterogenea, ben rappresentativa della pratica clinica quotidiana
- **Le persone con SM mostrano crescente necessità di aver accesso a strumenti clinici che possano aiutarli a monitorare e comprendere la malattia**

L'integrazione di dati acquisiti con nuove tecnologie e migliori metodiche di pre-esistenti strumenti (MRI) permette di ottenere informazioni complete da utilizzare nella cura del paziente e nella ricerca clinica

Obiettivo finale: sviluppare nuovi approcci alla medicina personalizzata nella SM

Grazie per l'attenzione

«Anche se la finestra è la stessa, non tutti quelli che si affacciano vedono le stesse cose: la veduta dipende dallo sguardo»

A. Merini